

母牛饲料怎么配比，繁殖母牛饲料配方介绍



1、在母牛的养殖过程中，饲料自配方的搭配是一项至关重要的工作。在母牛不同的生长阶段，其身体对营养的需求存在着显著的差异。例如，在犊牛期，母牛正处于生长发育的初期，身体的各项机能都在逐步完善，此时需要充足且均衡的营养来支持其骨骼、肌肉以及内脏器官的发育；育成期则是母牛身体快速生长和性成熟的关键时期，对蛋白质、矿物质等营养物质的需求较高，以满足其生长和生殖系统发育的需要；妊娠期又分为前期和后期，前期胎儿发育相对缓慢，母牛的营养需求主要是维持自身正常的生理功能和胎儿的初步发育，而到了后期，胎儿的生长速度加快，母牛需要更多的营养物质来满足胎儿的快速生长以及自身为分娩和哺乳做准备；哺乳期的母牛不仅要维持自身的身体状况，还要为幼崽提供充足的乳汁，因此对能量、蛋白质、钙、磷等营养物质的需求达到了高峰。

2、同时，在进行饲料自配方的搭配时，选择当地价格低廉且供应稳定的原料，不仅能够降低养殖成本，还能保证饲料的稳定供应，为了及时了解饲料配方的实际效果，建议定期记录母牛的采食量、体重变化以及产奶量等关键数据。通过对这些数据的分析，可以及时发现母牛

在生长过程中是否存在营养不足或过剩的情况，从而根据实际情况对饲料配方进行灵活调整，以达到最佳的养殖效果。以下是根据母牛不同生长阶段制定的配方及注意事项，供养殖户参考：

1.犊牛期配方：玉米 50%、豆粕 30%、麦麸 15%、鱼粉 3%、骨粉 1.2%、食盐 0.5%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

2.育成期配方：玉米 45%、豆粕 21.2%、麦麸 25%、棉籽饼 8%、食盐 0.5%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

3.妊娠前期配方：玉米 40%、豆粕 15%、麦麸 30%、菜粕 14.2%、食盐 0.5%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

4.妊娠后期配方：玉米 50%、豆粕 25%、麦麸 15%、鱼粉 3%、骨粉 6.2%、食盐 0.5%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

5.哺乳期配方：玉米 55%、豆粕 30%、麦麸 10%、鱼粉 2%、骨粉 2.2%、食盐 0.5%、**维诺母牛高维 0.1%、维诺霉清多矿 0.1%、维诺复合益生菌 0.1%**。

母牛饲料有哪些



2、原料选择注意事项

- 1.在选择饲料原料时，应充分考虑当地的资源优势，优先选用价格低廉且供应稳定的原料，如玉米、麦麸、豆粕、秸秆等。这样不仅可以降低养殖成本，还能保证饲料的稳定供应，避免因原料短缺而导致饲料配方的频繁变动，进而影响母牛的生长和生产性能。
- 2.一般来说，粗饲料需要进行粉碎或青贮处理。粉碎可以使粗饲料更易于被母牛消化吸收，提高饲料的利用率；青贮则是一种有效的保存粗饲料的方法，但在青贮过程中，需要将粗饲料压实密封，确保青贮料的酸度适中。
- 3.精料原料在使用前也需要进行适当的处理。首先，精料原料需粉碎均匀，以保证母牛能够充分消化吸收其中的营养成分。在混合精料时，要添加**维诺母牛高维**，以补充多种维生素。维生素对于母牛的生长发育、繁殖和免疫功能都具有重要的作用。同时，拌料**维诺霉清多矿**，它可以补充矿物质和微量元素，如 A、D、E，钙、磷、铁、锌等。这些矿物质和微量元素是母牛正常生理功能所必需的营养物质，缺乏任何一种都可能导致母牛出现营养缺乏症，影响其健康和生产性能。
- 4.在母牛的饲养过程中，可能会出现一些消化问题，如瘤胃胀气、腹泻等。这些问题的出现可能是由于精料过量或粗饲料霉变等原因引起的。当出现这种情况时，需要及时调整饲料配方。同时，为了改善母牛的肠道菌群，可以在饲料中添加**维诺复合益生菌**，调节母牛肠道内的微生物平衡，抑制有害菌的生长繁殖，增强母牛的免疫力和抵抗力，从而有效预防和治疗消化问题。

母牛吃什么料



友善大地，永续农业！