

下蛋鹅饲料自己如何配制，蛋鹅饲料日粮配方



1、蛋鹅自配饲料的核心在于精准满足产蛋期的营养需求，通过科学合理的配方设计，以能量饲料为基础、蛋白饲料为核心，同时巧妙搭配矿物质和维生素等营养成分，不仅能够有效降低饲料成本，还具备高度的适配性，能根据不同地区的实际情况灵活调整。

配方一、玉米 55%、豆粕 18%、麸皮 10%、石粉 12%、磷酸氢钙 4.4%、食盐 0.3%、**维诺蛋禽高维 0.1%**，**维诺霉清多矿 0.1%**，**维诺复合益生菌 0.1%**。

配方二、玉米 61.3%，菜粕 11.7%，鱼粉 1%，豆粕 23%，贝壳粉 1.1%，酸氢钙 1.3%，食盐 0.3%，**维诺蛋禽高维 0.1%**，**维诺霉清多矿 0.1%**，**维诺复合益生菌 0.1%**。

2、配料关键注意事项

1.原料筛选要点

玉米和豆粕：必须确保无霉变，因为霉变的玉米和豆粕可能含有黄曲霉毒素等有害物质，会对蛋鹅的健康造成严重危害，影响产蛋性能甚至导致死亡。

石粉细度：石粉的细度应控制在 20 - 40 目之间，过粗的石粉会影响蛋鹅的消化吸收，降低饲料的营养价值。

2.混合均匀技巧

微量成分预混：先将预混料、添加剂等微量成分进行充分混合，确保各种营养成分均匀分布。这是因为这些微量成分含量较少，如果直接与其他原料混合，容易出现混合不均的情况，导致部分蛋鹅摄入的营养成分不足或过量。

逐步加入大宗原料：在微量成分混合均匀后，再逐步加入玉米、豆粕等大宗原料，并保证混合时间不少于 5 分钟。这样可以进一步确保所有原料充分混合，使每一份饲料都能为蛋鹅提供均衡的营养。

3.灵活调整策略

原料替换原则：根据当地原料价格情况进行合理替换，例如用菜籽粕替代部分豆粕时，比例不得超过 8%，并且一定要进行脱毒处理。因为菜籽粕中含有一些抗营养因子，如芥子碱等，如果不进行脱毒处理，可能会对蛋鹅的生长和产蛋产生不良影响。

夏季调整方案：夏季气温较高，蛋鹅容易受到热应激的影响，此时可以减少玉米 5% 的比例，增加麸皮 3%、青绿饲料 2%。减少玉米的用量可以降低饲料的能量浓度，避免蛋鹅因摄入过多能量而产生热负担；增加麸皮可以提高饲料的纤维含量，促进蛋鹅的消化和排泄；添加青绿饲料不仅可以补充维生素和水分，还能在一定程度上起到降温的作用，缓解蛋鹅的热应激反应。

产蛋鹅吃什么料蛋多



4.青绿饲料搭配优势

补充维生素：自配料中搭配 20% - 30%的新鲜青绿饲料，如苜蓿、黑麦草、菜叶等，能够为蛋鹅提供丰富的维生素，尤其是维生素 A、维生素 C 和维生素 E 等，这些维生素对于维持蛋鹅的正常生理功能、提高免疫力和改善蛋品质具有重要意义。

降低成本：青绿饲料来源广泛，价格相对较低，将其纳入饲料配方中可以有效降低饲料成本，提高养殖效益。

3、饲喂建议

投喂量范围：每只蛋鹅每天的饲喂量应控制在 150 - 200g 之间，分 2 - 3 次投喂。这样的投喂方式可以避免蛋鹅暴饮暴食，减轻消化系统的负担，同时也有利于保持蛋鹅的食欲和消化功能的稳定。

定时定量：按照固定的时间进行投喂，让蛋鹅形成良好的进食习惯，有助于提高饲料的利用率和产蛋性能。

清洁饮水要求

全程供应：在整个饲养过程中，要始终为蛋鹅提供充足且清洁的饮水。水是蛋鹅生存所必需的物质，参与体内的各种代谢过程，对于维持体温、消化食物、吸收营养和排泄废物等都起着至关重要的作用。

饮水添加：在产蛋期，可以在饮水中添加**维诺蛋禽高维**，进一步提升蛋鹅的抗应激能力，减少因环境变化、疾病等因素对蛋鹅造成的不良影响，确保蛋鹅能够稳定地产蛋。

4、过渡期调整方法

过渡时长：从育成期饲料切换到产蛋料需要 7 天的过渡时间。这是因为突然更换饲料可能会导致蛋鹅的肠胃不适应，引起消化不良、腹泻等问题，影响蛋鹅的健康和生产性能。

逐步过渡：在这 7 天内，要逐步增加产蛋料的比例，相应地减少育成期饲料的比例。例如，第一天可以将产蛋料和育成期饲料按 1:9 的比例混合喂食，第二天调整为 2:8，依此类推，直到第七天全部换成产蛋料。这样可以让蛋鹅的肠胃逐渐适应新的饲料，减少应激反应的发生。

下蛋鹅吃啥饲料



友善大地，永续农业！